

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

## АМИНАЛОН®-КВ

### Состав лекарственного средства:

*действующее вещество:*  $\gamma$ -аминомасляная кислота;

1 капсула содержит  $\gamma$ -аминомасляной кислоты в пересчете на 100 % сухое вещество 0,25 г;

*вспомогательные вещества:* метилцеллюлоза, кальция стеарат.

**Лекарственная форма.** Капсулы твердые.

Твердые желатиновые капсулы № 1 с корпусом белого цвета и крышечкой голубого цвета. Содержимое капсул — порошок или спрессованная масса белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа.** Психостимулирующие и ноотропные средства. Кислота гамма-аминобутировая (ГАМК) и ее производные. Код АТС N06B X20\*\*.

*Фармакологические свойства.*  $\gamma$ -аминомасляная кислота (ГАМК) является основным медиатором процессов торможения в центральной нервной системе (ЦНС). Нейрометаболический эффект препарата обусловлен преимущественно стимулирующим влиянием на ГАМК-эргическую систему, что обеспечивает нормализацию динамики нервных процессов.

Под влиянием ГАМК активируются также энергетические процессы в тканях мозга, повышается их дыхательная активность и улучшается кровоснабжение.

Препарат способствует восстановлению двигательной активности, речи, других корковых функций после нарушения мозгового кровообращения. Обладает психостимулирующим действием: улучшает умственную деятельность, память, концентрацию внимания, а также ослабляет вестибулярные расстройства, нарушения сна.

Препарат быстро всасывается из пищеварительного тракта, подвергается биотрансформации в печени. Продукты распада выводятся из организма преимущественно с мочой.

**Показания к применению.** Различные заболевания ЦНС:

- сосудистые заболевания головного мозга (атеросклероз, поражения церебральных сосудов при артериальной гипертензии);
- хроническая недостаточность мозгового кровообращения с нарушением памяти, концентрации внимания, речи, головокружениями, головной болью;
- энцефалопатия (алкогольная, постинсультная, посттравматическая);
- детский церебральный паралич;
- отставание в умственном развитии у детей (возрастом старше 5 лет);
- старческое слабоумие (начальные стадии деменции);
- морская и воздушная болезни (для профилактики и лечения симптомокомплекса укачивания).

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Период

беременности и кормления грудью. Дети возрастом до 5 лет.

### **Надлежащие меры безопасности при применении.**

В начале лечения необходим контроль артериального давления в связи с возможностью его колебания.

Не рекомендуется применять препарат в вечернее время и перед сном из-за возможного нарушения сна.

Не рекомендуется во время лечения препаратом употреблять алкоголь.

### **Особые предостережения.**

#### ***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Не рекомендуется назначать препарат женщинам в период беременности и лактации.

***Способность влиять на быстроту реакций при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.*** При длительном применении необходимо проявлять осторожность лицам, занимающимся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и высокой скорости психомоторных реакций при управлении автотранспортом и при работе с механизмами. В первые дни применения препарата следует воздерживаться от управления транспортом и работы с потенциально опасными механизмами.

***Дети.*** Не рекомендуется назначать препарат детям возрастом до 5 лет.

**Способ применения и дозы.** Препарат принимают внутрь до еды. Взрослым назначают по 2–5 капсул (0,5–1,25 г) за прием в зависимости от течения и тяжести заболевания. Суточная доза обычно составляет 6–12 капсул (1,5–3 г) за 3 приема.

Детям препарат назначают, начиная с 5 лет, в зависимости от течения и тяжести заболевания по 2–12 капсул (0,5–3 г) в сутки. Суточную дозу разделяют на 3 приема, курс лечения — от 2 недель до 6 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы.

Для лечения симптомокомплекса укачивания назначают взрослым по 2 капсулы (0,5 г) и детям с 5 лет по одной капсуле (0,25 г) 3 раза в сутки в течение 3–4 суток. С профилактической целью назначают взрослым по 2 капсулы (0,5 г) 3 раза в сутки в течение 3 суток, предшествующих поездке или возможному укачиванию.

**Передозировка.** При значительном превышении терапевтических доз препарата, несоблюдении рекомендованных схем лечения могут развиваться тошнота, рвота, расстройства стула, головная боль, повышение температуры, колебания артериального давления, нарушения сна. В таких случаях необходимо прекратить применение препарата. Лечение симптоматическое.

**Побочные эффекты.** В отдельных случаях возможны:

- со стороны пищеварительной системы: диспептические явления, тошнота, рвота;
- со стороны нервной системы: нарушения сна;
- со стороны сердечно-сосудистой системы: колебания артериального давления чаще в первые дни применения;

- *общие*: ощущение жара, повышение температуры.
- При уменьшении дозы эти явления обычно проходят.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** При совместном применении с препаратами бензодиазепинового ряда (транквилизаторы, противосудорожные средства), а также с седативными средствами (барбитураты) отмечается взаимное усиление эффекта.

Пиридоксина гидрохлорид (витамин В<sub>6</sub>) также может усиливать действие Аминалона<sup>®</sup>-КВ.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.  
*Хранить в недоступном для детей месте.*

**Упаковка.** По 10 капсул в блистерах. По 10капсул в блистере; по 5 блистеров в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

