

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ИММУНОПЛЮС

## **Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* 1 таблетка содержит эхинацеи пурпурной (*Echinacea purpurea* L.) отжатого сока сухого 100 мг;

*вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный безводный, сорбит (Е 420), магния стеарат.

**Лекарственная форма.** Таблетки. Таблетки круглой формы с двояковыпуклой поверхностью от бледного желто-коричневого до коричневого цвета с вкраплениями.

**Фармакотерапевтическая группа.** Иммуностимуляторы. Код АТС L03A X.

Растительный биогенный стимулятор, оказывающий иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, стимулирует костно-мозговое кроветворение, в результате чего увеличивается число лейкоцитов и клеток ретикуло-эндотелиальной системы селезенки. Активирует преимущественно клеточный иммунитет, стимулирует фагоцитарную активность макрофагов и хемотаксис гранулоцитов, способствует высвобождению цитокинов, увеличивает продукцию интерлейкина-1 макрофагами, ускоряет трансформацию В-лимфоцитов в плазматические клетки, усиливает антителообразование и Т-хелперную активность. Повышает неспецифическую резистентность организма (в т. ч. к возбудителям гриппа и герпеса).

Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Выводится с мочой и калом.

**Показания к применению.** В составе комбинированной терапии при частых рецидивах инфекционных заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей.

При первых признаках ОРВИ, продолжительном применении антибиотиков.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к препарату или другим сложноцветным растениям (ромашка лекарственная, календула лекарственная, одуванчик и др.), туберкулез, ревматизм, системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка), хронические вирусные заболевания, СПИД или ВИЧ-инфекция, новообразования, первичный иммунодефицит, иммуносупрессия, заболевания лейкоцитарной системы крови (например лейкоз, агранулоцитоз).

**Надлежащие меры безопасности при применении.** С осторожностью применять больным сахарным диабетом (1 таблетка содержит 570 мг сорбита, что соответствует 0,05 ХЕ).

С осторожностью применять пациентам с врожденной чувствительностью к фруктозе.

Если респираторные заболевания имеют частые рецидивы и долговременные симптомы, которые проявляются затрудненным дыханием, лихорадкой, мокротой с примесью гноя или крови и т. д., необходимо обратиться к врачу. В случае усиления симптомов заболевания или повышения температуры тела во время лечения, следует немедленно обратиться к врачу.

В случае повторных жалоб на нарушение функции мочевыводящих органов необходимо пройти медицинское обследование, больной должен находиться под регулярным наблюдением врача.

Пациенты со склонностью к аллергии должны проконсультироваться с врачом перед приемом препарата, поскольку существует риск анафилактических реакций.

Прием препарата рекомендуется комбинировать с приемом витаминов А, Е, С.

### **Особые предостережения.**

#### ***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Не применяют.

#### ***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.***

Учитывая возможное влияние препарата на нервную систему, следует с осторожностью применять препарат при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

**Дети.** Препарат не рекомендуется назначать детям возрастом до 6 лет из-за отсутствия опыта применения.

**Способ применения и дозы.** Таблетки можно рассасывать, разжевывать или глотать, запивая жидкостью. Время приема препарата не зависит от времени приема пищи.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке (100 мг) 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 4 таблетки (400 мг).

Детям от 6 лет до 12 лет — по 1 таблетке (100 мг) в сутки. Максимальная суточная доза для этой возрастной группы — 1 таблетка (100 мг).

Продолжительность лечения — 10 дней при ежедневном приеме препарата или 20 дней — при приеме препарата через день. Максимальная продолжительность приема препарата не должна превышать 2 недель (при ежедневном приеме). При хронических заболеваниях курс лечения можно повторить после интервала в 2-3 недели.

**Передозировка.** *Симптомы:* тошнота, рвота, диарея, бессонница, повышенная возбудимость нервной системы.

*Лечение:* терапия симптоматическая, промывание желудка, энтеросорбенты.

**Побочные эффекты.** В отдельных случаях могут иметь место реакции гиперчувствительности (кожная сыпь и покраснение, зуд, ангионевротический отек лица), крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, одышка, бронхоспазм с обструкцией, анафилактический шок, астма, головокружение, снижение артериального давления; нарушение сна, тошнота, рвота, диарея, боль в животе.

Были отдельные сообщения о возможной связи с аутоиммунными заболеваниями (диссеминированный энцефаломиелит, узелковая эритема, иммунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена-Ларсена с нарушением тубулярной функции почек).

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Вследствие иммуностимулирующего действия эхинацея может уменьшать эффективность препаратов, имеющих иммунодепрессивное действие.

Препарат не рекомендуется применять одновременно с препаратами с гепатотоксическим действием, такими как амиодарон, метотрексат, кетоконазол, стероидные препараты.

**Срок годности.** 2 года.

**Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 10 таблеток в блистере; по 2 блистера в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

