

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА НОРМОВЕН

**Состав: действующее вещество:** 1 таблетка содержит флавоноидной фракции 500 мг, которая содержит диосмина 450 мг, гесперидина 50 мг; **вспомогательные вещества:** натрия крахмалгликолят (тип А), целлюлоза микрокристаллическая, гидроксипропилметилцеллюлоза, циклодекстрин, магния стеарат; оболочка: смесь для пленочного покрытия Opadry II Yellow (гидроксипропилметилцеллюлоза; лактоза, моногидрат; полиэтиленгликоль; триацетин; хинолиновый желтый (Е 104); титана диоксид (Е 171); индигокармин (Е 132), желтый закат FCF (Е 110)).

**Лекарственная форма.** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

**Основные физико-химические свойства:** таблетки круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой от желтого до коричневатого-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа.** Капилляростабилизирующие средства. Биофлавоноиды. Диосмин, комбинации. Код АТХ С05С А53.

**Фармакологические свойства.**

**Фармакодинамика.** Нормовен оказывает венотоническое и ангиопротекторное действия, повышает венозный тонус, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, уменьшает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток. Лекарственное средство также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки вен и створки клапанов вен.

**Фармакокинетика.** Период полувыведения лекарственного средства составляет 11 часов. Выведение действующего вещества происходит главным образом через кишечник. Через мочу выводится в среднем 14 % принятой дозы. Клинические характеристики.

**Показания.** Симптоматическое лечение венолимфатической недостаточности (тяжесть в ногах, боль, отеки). Симптоматическое лечение геморроя.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Исследований относительно взаимодействия не проводили. О взаимодействии с другими лекарственными средствами до сих пор не сообщалось (принимая во внимание большой пострегистрационный опыт применения лекарственного средства).

**Особенности применения.** Применение данного лекарственного средства при остром геморрое не заменяет специфического лечения и не препятствует лечению других проктологических заболеваний. В случае, если в течение короткого курса лечения симптомы не исчезают быстро, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть терапию. При нарушениях венозного кровообращения более эффективное лечение обеспечивается сочетанием терапии с соблюдением таких рекомендаций относительно образа

жизни: - следует избегать длительного пребывания на солнце, долгосрочного пребывания на ногах, избыточной массы тела; - следует ходить пешком и в некоторых случаях носить специальные чулки для улучшения кровообращения.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Беременным женщинам лекарственное средство следует применять с осторожностью. Перед применением следует проконсультироваться с врачом. Известно, что комбинация активных веществ, входящих в состав лекарственного средства, не оказывает тератогенного действия; о побочных эффектах не сообщалось. Из-за отсутствия данных относительно проникновения лекарственного средства в грудное молоко применения лекарственного средства в период кормления грудью следует избегать. Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии влияния активных веществ на фертильность крыс.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.** Лекарственное средство не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с разными механизмами. Следует соблюдать осторожность в случае появления признаков побочного действия лекарственного средства (см. раздел «Побочные реакции»).

**Способ применения и дозы.** Для перорального применения. Назначать взрослым. Лечение венолимфатической недостаточности (симптомы: отеки, боль, тяжесть в ногах, ночные судороги, трофические язвы, лимфедема и т.д.). Рекомендованная дозировка составляет 2 таблетки в сутки: 1 таблетка - днем и 1 таблетка - вечером, во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды. Лечение хронического геморроя По 2 таблетки в сутки (в два приема) во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды. Лечение острого геморроя По 6 таблеток в сутки в течение 4 дней, затем по 4 таблетки в сутки в течение следующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное количество таблеток распределить на 2-3 приема. Курс лечения Длительность лечения зависит от показания к применению и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения составляет 2-3 месяца.

**Дети.** Данные относительно применения лекарственного средства Нормовен детям отсутствуют.

**Передозировка.** О случаях передозировки не сообщалось.

**Побочные реакции.** Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, недомогание. Со стороны желудочно-кишечной системы: диарея, диспепсия, тошнота, рвота; колит. Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница; изолированный отек лица, губ, век. В исключительных случаях - отек Квинке. Из-за содержания в составе лекарственного средства желтого заката FCF возможны аллергические реакции.

**Срок годности.** 2 года.

**Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 10 таблеток в блистере. По 3 или 6 блистеров в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Производитель.** АО «КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД». Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. 04073, Украина, г. Киев, ул. Копыловская, 38.

**Web-сайт:** [www.vitamin.com.ua](http://www.vitamin.com.ua).

*Дата последнего пересмотра.* 11.05.2018

