

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

## КОРВАЛМЕНТ®

### **Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты;

1 капсула содержит 100 мг (0,1 г) раствора ментола в ментиловом эфире кислоты изовалериановой.

*вспомогательные вещества:* желатиновая оболочка капсулы (желатин, глицерин, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216)).

**Лекарственная форма.** Капсулы мягкие.

Мягкие желатиновые капсулы шарообразной или сферической формы, со швом, бесцветные или от слабо-желтого до светлого коричневатого-желтого цвета, заполненные прозрачной бесцветной или с желтоватым оттенком маслянистой жидкостью с запахом ментола.

**Фармакотерапевтическая группа.** Комбинированные кардиологические средства. Код АТС С01Е Х.

Препарат проявляет умеренное сосудорасширяющее (коронаролитическое) влияние путем рефлекторного раздражения чувствительных нервных («холодовых») рецепторов слизистой оболочки ротовой полости и оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему. Стимуляция рецепторов сопровождается индукцией высвобождения эндорфинов, энкефалинов, динорфинов и других опиоидных пептидов, играющих важную роль в уменьшении болевого ощущения, нормализации проницаемости сосудов и регуляции других важных механизмов функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Под влиянием препарата освобождаются физиологически активные соединения — гистамин, кинины и т.д.

При сублингвальном применении препарат абсорбируется со слизистой оболочки ротовой полости. Терапевтический эффект наступает приблизительно через 5 минут.

После всасывания препарат биотрансформируется в печени и выделяется с мочой в виде глюкуронидов.

**Показания к применению.** Легкие приступы стенокардии, неврозы, истерия, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни, головная боль, связанная с применением нитратов.

**Противопоказания.** повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, выраженная артериальная гипотензия, детский возраст.

**Надлежащие меры безопасности при применении.** Препарат не следует применять при тяжелых приступах стенокардии. Препарат не содержит сахара и может применяться пациентам, больным сахарным диабетом.

**Особые предостережения.**

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый терапевтический эффект превышает возможный риск для плода/ребенка.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Необходима осторожность в первые часы после приема препарата при управлении транспортными средствами или работе, требующей повышенного внимания, из-за возможных побочных эффектов (головокружение и сонливость).

**Дети.** Опыта применения препарата в детском возрасте нет.

**Способ применения и дозы.** Корвалмент® принимают под язык. Капсулу держат под языком до ее полного растворения. Для ускорения эффекта можно раздавить капсулу зубами.

Частота приема препарата зависит от частоты приступов стенокардии. При приступах принимают по 1 капсуле под язык. При необходимости лечения стенокардии и других состояний максимальная суточная доза препарата может составлять 6 капсул (600 мг) в сутки. Длительность лечения — до 7 дней.

### **Передозировка.**

*Симптомы:* головная боль, тошнота, возбуждение, понижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы, нарушение сердечной деятельности, реакции гиперчувствительности (ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь).

*Лечение:* прекращение приема препарата, симптоматическая терапия.

**Побочные эффекты.** В единичных случаях возможны тошнота, дискомфорт в животе, слезотечение, головокружение. При длительном применении — кратковременная артериальная гипотензия, сонливость. Эти явления кратковременны, проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций, в том числе отек Квинке, сыпь, зуд.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Допускается применение Корвалмента® в комплексе с препаратами, улучшающими обменные процессы (витамины, аспаркам, рибоксин). Препарат может усиливать действие антигипертензивных препаратов при одновременном применении.

Может усиливать седативный эффект психотропных средств, опиоидных анальгетиков, алкоголя и средств для наркоза. Одновременное применение с нейротропными препаратами, угнетающими центральную нервную систему, вызывает сонливость.

**Срок годности.** 2 года.

**Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 10 капсул в блистерах. По 10 капсул в блистере; по 3 блистера в пачке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

