

# ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ

## АМІНАЛОН® -КВ

### Склад лікарського засобу:

*діюча речовина:* γ-аміномасляна кислота;

1 капсула містить γ-аміномасляної кислоти у перерахуванні на 100 % суху речовину 0,25 г;

*допоміжні речовини:* метилцелюлоза, кальцію стеарат.

**Лікарська форма.** Капсули тверді.

Тверді желатинові капсули № 1 з корпусом білого кольору і кришечкою блакитного кольору. Вміст капсул — порошок або спресована маса білого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Психостимулюючі та ноотропні засоби. Кислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідні. Код АТС N06B X20\*\*.

*Фармакологічні властивості.* γ-аміномасляна кислота (ГАМК) є основним медіатором процесів гальмування в центральній нервовій системі (ЦНС). Нейрометаболический ефект препарату зумовлений переважно стимулюючим впливом на ГАМК-ергічну систему, що забезпечує нормалізацію динаміки нервових процесів.

Під впливом ГАМК активуються також енергетичні процеси у тканинах мозку, підвищується їх дихальна активність та покращується кровопостачання.

Препарат сприяє відновленню рухів, мови, інших коркових функцій після порушення мозкового кровообігу. Має психостимулюючу дію: покращує розумову діяльність, пам'ять, концентрацію уваги, а також послаблює вестибулярні розлади, порушення сну.

Препарат швидко всмоктується з травного тракту, піддається біотрансформації в печінці. Продукти розпаду виводяться з організму переважно з сечею.

**Показання для застосування.** Різні захворювання ЦНС:

- судинні захворювання головного мозку (атеросклероз, ураження церебральних судин при артеріальній гіпертензії);
- хронічна недостатність мозкового кровообігу з порушенням пам'яті, концентрації уваги, мови, запамороченнями, головним болем;
- енцефалопатія (алкогольна, постінсультна, посттравматична);
- дитячий церебральний параліч;
- відставання розумового розвитку у дітей (віком понад 5 років);
- старече слабоумство (початкові стадії деменції);
- морська та повітряна хвороби (для профілактики та лікування симптомокомплексу захитування).

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату. Період вагітності та годування груддю. Діти віком до 5 років.

## **Належні заходи безпеки при застосуванні.**

На початку лікування необхідний контроль артеріального тиску через можливість його коливання.

Не рекомендується застосовувати препарат у вечірній час і перед сном через можливе порушення сну.

Не рекомендується під час лікування препаратом вживати алкоголь.

## **Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Не рекомендується призначати препарат жінкам у період вагітності та лактації.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** При тривалому застосуванні препарату необхідно виявляти обережність особам, які займаються потенційно небезпечними видами діяльності, що вимагають підвищеної уваги і високої швидкості психомоторних реакцій при керуванні автотранспортом і при роботі з механізмами. У перші дні застосування препарату слід утримуватися від керування транспортом і роботи з потенційно небезпечними механізмами.

**Діти.** Не рекомендується призначати препарат дітям віком до 5 років.

**Спосіб застосування та дози.** Препарат приймають внутрішньо до їди. Дорослим призначають по 2-5 капсул (0,5-1,25 г) за прийом залежно від перебігу та тяжкості захворювання. Добова доза зазвичай складає 6-12 капсул (1,5-3 г) за 3 прийоми.

Дітям препарат призначають, починаючи з 5 років, залежно від перебігу і тяжкості захворювання по 2-12 капсул (0,5-3 г) на добу. Добову дозу розділяють на 3 прийоми, курс лікування - від 2 тижнів до 6 місяців. При необхідності проводять повторні курси.

Для лікування симптомокомплексу захитування призначають дорослим по 2 капсули (0,5 г) та дітям з 5 років по одній капсулі (0,25 г) 3 рази на добу протягом 3-4 діб. З профілактичною метою призначають дорослим по 2 капсули (0,5 г) 3 рази на добу протягом 3 діб, що передують поїздки або можливого захитуванню.

**Передозування.** При значному перевищенні терапевтичних доз препарату, недотриманні рекомендованих схем лікування можуть розвиватися нудота, блювання, розлади кишечника, головний біль, підвищення температури, коливання артеріального тиску, порушення сну. В таких випадках необхідно припинити застосування препарату. Лікування симптоматичне.

**Побічні ефекти.** В окремих випадках можливі:

- з боку системи травлення: диспептичні явища, нудота, блювання;
- з боку нервової системи: порушення сну;
- з боку серцево-судинної системи: коливання артеріального тиску частіше в перші дні застосування;
- загальні: відчуття жару, підвищення температури.

При зменшенні дози ці явища зазвичай минають.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** При сумісному

застосуванні з препаратами бензодіазепінового ряду (транквілізатори, протисудомні засоби), а також із седативними засобами (барбітурати) спостерігається взаємне посилення ефекту.

Піридоксину гідрохлорид (вітамін В<sub>6</sub>) також може посилювати дію Аміналону®-КВ.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.  
*Зберігати в недоступному для дітей місці.*

**Упаковка.** По 10 капсул у блістерах. По 10 капсул у блістері; по 5 блістерів у пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

