

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГЛЮКОЗА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: dextrose; D-глюкоза;

1 таблетка містить глюкози моногідрату 1 г;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, тальк, кальцію стеарат, кислота стеаринова.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки круглої форми з плоскою поверхнею зі скошеними краями і рискою, білого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси. Код АТС А16АХ.

Глюкоза бере участь в енергетичному та вуглеводному обміні, забезпечує поповнення енерговитрат, поліпшує антитоксичну функцію печінки, посилює скорочувальну діяльність серцевого м'яза та діурез.

Препарат добре всмоктується у травному тракті, з током крові розноситься в усі органи і тканини; продукти його обміну виводяться із сечею.

Показання для застосування.

Гіпоглікемія. Поповнення легкозасвоюваних вуглеводів при фізичних і розумових навантаженнях.

Протипоказання. Цукровий діабет і різні стани, що супроводжуються гіперглікемією. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендують призначати хворим зі зниженою толерантністю до глюкози.

При тривалому застосуванні високих доз препарату необхідний контроль рівня цукру у крові.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю. Необхідно дотримуватися дозування та тривалості курсу відповідно до рекомендацій лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти. Даних щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям віком до 3 років немає, тому дану лікарську форму не застосовують у цьому віці.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 3 років: препарат приймають внутрішньо по $\frac{1}{2}$ -1 таблетці (0,5-1 г) на добу.

Дози та тривалість лікування залежать від характеру та перебігу захворювання, ефективності лікування.

Передозування.

Симптоми: при одноразовому застосуванні великої кількості препарату спостерігається порушення травлення (нудота, здуття живота, пронос).

Лікування: відміна препарату. Симптоматична терапія.

Побічні ефекти. У осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Взаємодія невідома.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 таблеток у контурних безчарункових упаковках.

По 10 таблеток у блістерах.

По 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

