

## Едоксакорд - таблетка, вкрита плівковою оболонкою (Edoxaban)

Будь ласка, завжди тримайте цю інформацію з попередженням для пацієнтів при собі.

Покажіть цю інформацію з попередженням для пацієнтів своєму лікарю, фармацевту, хірургу або стоматологу перед будь-яким лікуванням або медичним втручанням.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТА

Прізвище та ім'я пацієнта: \_\_\_\_\_

Дата народження: \_\_\_\_\_

У разі надзвичайної ситуації звертайтеся: \_\_\_\_\_

Прізвище та ім'я \_\_\_\_\_

Номер телефону: \_\_\_\_\_

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКУВАННЯ

(Заповнює лікар)

Едоксакорд призначається 1 раз на добу у дозі: \_\_\_\_\_ мг

Початок лікування: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (місяць/рік)

Група крові: \_\_\_\_\_

Інші ліки/стани: \_\_\_\_\_

### ОПИС ІНФОРМАЦІЇ

Для отримання додаткової інформації або у разі надзвичайної ситуації, звертайтеся:

Прізвище та ім'я лікаря: \_\_\_\_\_

Номер телефону, печатка лікаря: \_\_\_\_\_

Підпис лікаря: \_\_\_\_\_

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

- Едоксакорд є пероральним інгібітором антикоагулянтного фактора Ха.
- Під час хірургічних чи інших процедур, застосування едоксабану слід припинити якомога раніше, щонайменше за 24 години до втручання.
- Едоксакорд може збільшити ризик розвитку кровотечі. У разі клінічно значущої кровотечі негайно припинити лікування.
- Незважаючи на те, що лікування едоксабаном не вимагає регулярного моніторингу, вплив на антикоагуляційну дію може бути оцінений шляхом каліброваного кількісного аналізу на антифактор Ха, результати якого можуть допомогти при прийнятті клінічних рішень у певних ситуаціях, наприклад при передозуванні або екстремому хірургічному втручанні.

Едоксабан подовжує значення стандартних тестів на згортання крові, таких як аналіз на ПЧ, МНВ та аЧТЧ в результаті пригнічення фактора Ха. Однак зміни цих тестів на згортання крові при застосуванні препарату в очікуваному терапевтичному діапазоні є незначними та пояснюються високим ступенем змінності і не є корисними для моніторингу антикоагуляційного ефекту едоксабану.

Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції для медичного застосування.

## ПРО ВАШЕ ЛІКУВАННЯ

Вам призначили Едоксакорд - антикоагулянтний препарат, який розріджує кров і допомагає запобігти утворенню тромбів. Важливо приймати ліки точно так, як це призначив лікар.

- Якщо ви пропустили дозу, прийміть її негайно, а потім продовжуйте приймати Едоксакорд, як зазвичай. Не приймайте подвійну дозу за один день.
- Перед початком прийому інших ліків (у тому числі без рецепта) будь-ласка проконсультуйтеся з лікарем.
- Не припиняйте прийом препарату Едоксакорд без консультації з лікарем, оскільки це може збільшити ризик розвитку тромбозу.
- Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування, яка міститься в кожній упаковці препарату Едоксакорд.

## ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ЛІКАРЯ У РАЗІ РИЗИКУ КРОВОТЕЧІ

Прийом антикоагулянтних препаратів, таких як Едоксакорд, може збільшити ризик розвитку кровотечі. Тому важливо знати про можливі ознаки та симптоми кровотечі. Негайно зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте щонебудь з наведеного нижче:

- Шкірний крововилив у м'які тканини
- Запаморочення або головний біль
- Кровохаркання
- Носова кровотеча
- Кровотечі у ротовій порожнині/глотці
- Кровотечі в нижніх і верхніх відділах шлунково-кишкового тракту
- Кровотечі в місці хірургічних процедур
- Уретральна кровотеча • Вагінальні кровотечі

Будь ласка, зверніться до лікаря, якщо у Вас виникли якісь незвичні симптоми.